


VIGILANCE FIÈVRE APHTEUSE

Eleveurs de porcs

Signes cliniques

- Fièvre
- Perte d'appétit
- Boiterie : les porcs « marchent sur des aiguilles » ou ont des difficultés à se lever (les porcs restent assis par exemple).
- Présence d'aphtes (vésicules puis ulcères) sur les zones au-dessus des ongles, sur la mamelle, le groin, dans la bouche, pouvant entraîner une hypersalivation (l'animal bave)
- Mortalité sur les porcelets allaités.

A noter : généralement peu de mortalité chez les adultes.



SI VOUS CONSTATEZ CES SIGNES CLINIQUES, CONTACTEZ SANS DÉLAI VOTRE VÉTÉRINAIRE !

La fièvre aphteuse est la maladie virale du bétail la plus contagieuse. Elle peut toucher, entre autres, les porcs et les ruminants. Ses conséquences sur les élevages et sur l'économie agricole d'un pays sont catastrophiques.

La fièvre aphteuse n'est pas transmissible à l'Homme.

La France est officiellement indemne de fièvre aphteuse mais la maladie est présente dans plusieurs régions du monde et se propage.

Les modes d'introduction de la maladie sont nombreux :

- par contact avec des animaux contaminés ;
- par distribution à des porcs de restes alimentaires ;
- par introduction d'animaux a priori « sains », illégalement ou en provenance d'un pays n'ayant pas encore déclaré la présence de la maladie ;
- par passage dans l'élevage de personnes, de matériel ou de véhicules ayant transité dans des élevages contaminés.