

GESTION DES TRUIES A LA MISE BAS

En maternité, la santé de la truie et des porcelets sont entre autres liés au bon déroulement des mises bas (synchronisation, surveillance et assistance en cas de problème) et de la lactation, notamment les premières tétés.

Groupement des mises bas

Intérêt

Il existe des liens étroits entre le groupement des mises bas et la maîtrise de la santé en élevage ; cette réduction de l'étalement des naissances permet de :

- Faciliter la surveillance et les interventions ;
- Donner plus de souplesse dans la pratique des adoptions ;
- Obtenir des âges au sevrage plus homogènes ;
- Limiter les risques de sevrage trop précoce en cas de lactation de trois semaines.

Mise en pratique

1. Grouper les chaleurs :

- par des pratiques « naturelles » : limitation des pertes d'état en maternité, sevrage de qualité, stimulation (flushing, douches, contacts verrats, programme lumineux en maternité et en verraterie), respect de la conduite en bande (peu de truies décalées, cochettes bien introduites dans les bandes)...
- par des traitements au sevrage : stimulation et synchronisation ovarienne

2. Si besoin, induire les mises bas : il est indispensable au préalable d'évaluer la durée de gestation spontanée de son troupeau (variable selon les types génétiques). Les déclenchements doivent être réalisés au cas par cas, en tenant compte des dates de termes prévus et selon le conseil du vétérinaire.

Attention : Induction précoce = Naissances prématurées = Augmentation du taux de morts-nés, de porcelets immatures et chétifs + Diminution de la production colostrale, de l'immunité et de la survie des porcelets

Surveillance des mises bas

Objectifs

Détecter les mises bas anormalement longues (plus de 4 heures), douloureuses ou avec beaucoup de morts-nés et d'intervenir si besoin

Surveiller des indicateurs de pathologies (nombreux morts-nés ou momifiés)

Bonnes pratiques

- Etre plus présent en maternité (adaptation des plages de travail)
- Repérer des signes de mise bas (écoulements de lait), pour focaliser la surveillance
- Ne pas déranger les truies (prévention du stress, interventions calmes, apprivoisement)
- Suivre le déroulement des mises bas (rythme d'expulsion des porcelets, comportement de la truie, nombre de morts-nés...), à l'aide d'un chronopart sur papier ou d'outils spécifiques.

Il est important d'enregistrer les interventions et les problèmes sur la fiche de la truie pour mieux prendre en charge sa lactation et piloter sa carrière.

A savoir : les truies préfèrent mettre bas la nuit ou en dehors de la présence humaine. En l'absence de surveillance, il faut donc que les truies soient calmes et en bonne santé et que le confort de la zone de naissance soit maximum. Le jour suivant, la prise en charge des porcelets nés durant la nuit et le suivi des dernières mises bas est une priorité.



Assistance apportée aux truies pendant la mise bas

En cas de bon déroulement des mises bas, il faut intervenir le moins possible sur les truies pour se consacrer au maximum aux soins aux porcelets.

En cas de problème, il existe trois types d'assistance :



1. Stimulation : il suffit parfois de lever la truie, de masser la mamelle ou de mettre des porcelets à téter pour relancer les contractions et l'expulsion des porcelets.

2. Fouille : elle consiste à vérifier la dilatation du col et / ou à extraire les porcelets bloqués. Le respect d'une bonne hygiène est indispensable pour cette intervention : gant à usage unique avec un gel antiseptique. Des fouilles répétées sont déconseillées car elles augmentent les risques d'infection uro-génitale. Après la fouille, les truies concernées doivent faire l'objet d'une surveillance accrue : contrôle de l'appétit, de la fièvre, du déroulement des tétées...

3. Assistance médicamenteuse : différents traitements existent pour limiter le stress des truies, favoriser l'ouverture du col, stimuler les contractions, provoquer la vidange utérine ou l'expulsion du placenta. Le choix du produit et sa posologie sont à valider avec le vétérinaire.

Prévention des mises bas longues

Un allongement de la durée des mises bas conduit à une fatigue de la truie, une souffrance des porcelets bloqués, une augmentation de la mortinatalité et un retard de prise colostrale des derniers nés.

Il existe divers facteurs de risque pouvant conduire à un allongement des mises bas. Ils se rattachent à 6 mots clés : Truie, Maladies, Porcelet, Eleveur, Environnement extérieur et Alimentation / Abreuvement.

